

西醫基層醫療服務審查執行會東區分會 102 年花蓮區審查醫師研討會議紀錄

時間：102 年 5 月 3 日（星期五）12：30-14：30

地點：花蓮縣醫師公會、署立台東醫院

主席：鄒永宏醫師、蔡明宏醫師

紀錄：洪珮娟

出席：花東各內科審查醫師

列席：台東縣醫師公會 江麗雪

中央健康保險局東區業務組 陳陸英 林桂英

西醫基層醫療服務審查執行會東區分會 洪珮娟

壹、主席致詞(略)

貳、東區業務組報告(略)

參、提案事項

提案一

提案人：花蓮區審查醫師

案由：糖尿病第一線用藥 Metformin 于 $Cre > 1.4$ 時，因有藥物累積造成
乳酸中毒之風險，可不用之。

說明：今一病患，腎功能 Cre 為 1.2 但 $e-GFR$ 為 56(屬 CKD stage 3a)，
可否以 CKD 為由，逕用 TZD & DDP-4inhibitor，而不用 Metformin?

辦法：請討論 Metformin 于腎功能不良而不使用它的依據是看 $Cre > 1.4$
或看 $e-GFR$ 以建立審查共識。

決議：(一) 花東兩區內科審查醫師針對 Metformin 使用依據如下。

	花蓮區審查醫師(102.3.6)	台東區審查醫師(102.3.13)
決議	不考慮 $e-GFR$ 作為 Metformin 使用的依據，只考慮 Creatine，對於男性 >1.5 、女性 > 1.4 不適用，可逕用 TZD。	1.可使用 Creatine 或 $e-GFR$ 作為 Metformin 使用的依據。 2.如果不使用 Metformin，可處方其他合適的用藥。

(二) 東區健保局業務組 102 年 4 月 3 日來函亟需建立審查共識，建
請加強共識機制，俾提升審查品質。

結論：(一) 參照「2012 糖尿病臨床照護指引」為依據，1.Creatine 對於男性 >1.5 、女性 >1.4 不適用；2.肌酐酸清除率 $CCR < 30\text{ml/min}$ ；3.合併有肝、腎、心臟功能不全時不建議用；4.以前未曾使用 metformin 的 80 歲以上第二型糖尿病人，也不建議開始使用 metformin；5.接受顯影劑檢查的病人等。

(二) 如果不能使用 Metformin，可選擇其他合適的處方用藥，非得 TZD 或 DDP-4inhibitor 不可，例如 sulfonylurea、Biguanides 等。

肆、 散會：下午 14 點 20 分